

lieu de provenance n'ayant pu être déterminé, il en est résulté que l'espèce n'a point été admise dans les catalogues méthodiques; toutefois, celui publié par M. SCHINTZ, cite *l'annulatus* de DESMAREST, en le classant avec doute, parmi les espèces des deux Amériques; WAGNER SCHREBER supplément, le rapproche de *Sciurus Lewini* du Missouri; son *habitat*, bien déterminé aujourd'hui, est la côte occidentale de l'Afrique. Il fait partie d'un petit groupe, auquel, indépendamment des espèces citées ici, viennent se réunir *Sciurus multicolor* de RUPPELL, trouvé en Abyssinie et *Sciurus cepapi* de SMITH, du pays des Cafres.

Cet écureuil a le pelage d'un gris-verdâtre clair, provenant de ce que les poils sont gris à la base et terminés de jaune-roussâtre; tous sont annelés, à partir de la base, d'une large bande jaunâtre, suivie d'une noire plus étroite, que termine une bande jaune roussâtre. Menton, devant du cou, poitrine, ventre, et pattes d'un blanc assez pur; oreilles ovales, noires au bout et intérieurement; queue très-longue, ronde, annelée en travers de noir et de blanc.

Longueur totale de 17 à 20 pouces, sur laquelle on compte de $10\frac{1}{2}$ à 11 pouces pour la queue.

SCIURUS ANNULATUS, Desm. *Tab. meth. des Mamm.*, pag. 538, sp. 546.

Patrie. La Sénégambie, très-commun au Sénégal.

ÉCUREUIL POINTILLÉ. *SCIURUS PUNCTATUS*.

A juger d'après huit individus, tués à des époques

différentes, quoique assez rapprochées, de l'année, l'on pourrait présumer que l'espèce conserve la coloration de sa livrée dans toutes les saisons; si un neuvième individu, tué à une date plus éloignée d'un mois environ des huit autres, ne nous avait fourni la preuve d'une double livrée, à la vérité peu disparate de l'autre, mais qui produit cette différence du pelage, dans les deux saisons opposées de l'année, probablement par l'usure ou le dépérissement du bout des poils.

Sur quatre de ces individus, l'on ne voit entre-eux aucune différence de coloration. Le corps, la tête, les membres et la base de la queue sont d'un noir parfait, pointillé, sur toutes ces parties, de petites taches d'un roux clair; ces mouchetures proviennent de ce que chaque poil est annelé de deux petites bandes noires et de deux autres rousses, la dernière terminale, produit les petites taches disséminées à peu-près sur toutes les parties. La face est d'un roux clair et les moustaches y prennent naissance. Tout le dessous du corps, du cou, ainsi que la face interne des membres sont d'un blanc paraissant terni, vu que la base des poils est d'un teinté foncée. La base de la queue est colorée comme le dos, le reste est annelé de bandes noires, assez larges, et par d'autres plus étroites, d'un roux clair; leur bout terminal est blanc; la pointe extrême de la queue est roussâtre.

Un individu, revêtu de ce pelage sur la majeure partie du corps, nous a offert aux joues et sur les côtés du cou les indices du changement de la livrée. Les parties indiquées sont annelées, à distance égale, de petites stries

noires et blanches, la strie terminale de cette couleur produit des mouchetures plus claires, sur ce fond toujours noir de la robe, qui est pour lors régulièrement annelée de noir et de blanc.

Longueur totale des vieux 14 pouces ou 6 lignes en plus, dont la queue prend 9 pouces.

Patrie. L'espèce est commune dans toutes les forêts de la Guinée, mais elle semble choisir de préférence celles du bord des rivières.

ÉCUREUIL DE GAMBIE. *SCIURUS GAMBIANUS*.

Encore un de ces noms de lieu, de district ou de rivière, dont les naturalistes anglais sont si prodigues dans les épithètes, qu'ils donnent aux animaux, notés par eux dans les *Proceedings*, voir année 1855, p. 103; où l'espèce est indiquée en ces termes.

Cet animal appartient au groupe des écureuils à oreilles arrondies, non touffues, et qui ont une queue cylindrique, couverte de poils courts, non distiques.

La partie supérieure du corps et la base de la queue, sont d'une couleur brune uniforme de souris, avec une légère teinte de jaune rougeâtre, partout pointillée de gris, vu que les poils sont annelés de noir et de blanc jaunâtre. La queue est longue, couverte de poils courts, ayant à sa base la même couleur uniforme du dos; mais annelée ou rayée depuis là jusqu'au bout de bandes nombreuses noires et d'un gris-brun clair, exac-